

ШРОТ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ (ГРАНУЛИРОВАННЫЙ И НЕГРАНУЛИРОВАННЫЙ)

В продукте содержится 36-38% сырого протеина, аминокислоты и метионин, витамины Е и В, клетчатка, натуральные белки, калий, фосфор и другие минеральные вещества.

Основные качественные показатели:

- массовая доля влаги и летучих веществ – 8-12%
- массовая доля сырого протеина в пересчете на а.с.в. вещество – не менее 36%
- массовая доля сырой клетчатки в пересчете на а.с.в. вещество – не более 23%
- массовая доля сырого жира в пересчете на а.с.в. вещество – не более 4%
- общая энергетическая питательность – не менее 0,918 к.ед.
- плотность шрота гранулированного подсолнечного – 550-630 кг/м³
- плотность шрота подсолнечного негранулированного – 430-480 кг/м³

Упаковка/тара: насыпью

Подсолнечный шрот сертифицирован и соответствует СТО Завода изготовителя «Шрот подсолнечный. Технические условия». Сопровождается ветеринарным свидетельством, карантинным сертификатом, сертификатом соответствия и качественным удостоверением.

ЛЕЦИТИН

Лецитин – смесь натуральных веществ на основе фосфолипидов, извлекаемых физическими методами из нерафинированного подсолнечного масла в процессе гидратации и последующей вакуумной сушки.

Основные качественные показатели:

- массовая доля веществ, нерастворимых в ацетоне – не менее 60%
- массовая доля веществ, нерастворимых в гексане – не более 2%
- цветное число в 10% растворе гексана, мг йода – не более 80
- массовая доля влаги и летучих веществ – не более 3%
- кислотное число – не более 36 мг КОН/г
- перекисное число – не более 25 моль активного кислорода/кг

Упаковка/тара: картонные барабаны с полиэтиленовой вставкой/налив.

Товар проходит строгий контроль качества и соответствует СТО 86278130-006-2011, сопровождается качественным удостоверением.

ШРОТ РАПСОВЫЙ

Рапсовый шрот содержит рибофлавин, фолиевую кислоту, тиамин, природные антиоксиданты токоферол (витамин Е), фенольные соединения.

Основные качественные показатели:

- массовая доля влаги и летучих веществ – 8-12%
- массовая доля сырого протеина в пересчете на а.с.в. вещество – не менее 38%
- массовая доля сырой клетчатки в пересчете на а.с.в. вещество – не более 16%
- массовая доля сырого жира в пересчете на а.с.в. вещество – 4%
- общая энергетическая питательность – не менее 0,6 к.ед.
- плотность шрота гранулированного рапсового – 650-720 кг/м³

Упаковка/тара: насыпью.

Рапсовый шрот сертифицирован и соответствует СТО Завода изготовителя «Шрот рапсовый. Технические условия». Сопровождается ветеринарным свидетельством, карантинным сертификатом, сертификатом соответствия и качественным удостоверением.